

UPUTSTVO ZA UPOTREBU ISKADORA

Originalno pakovanje sadrži 14 ampula, po sedam u dva vertikalna reda. Ampule se aplikuju isključivo potkožno, u blizini mesta koje je zahvaćeno bolešću, levo ili desno, gore ili dole, nekoliko santimetara od centra mesta, odnosno oblasti koja je zahvaćena. Važno je napomenuti da su ampule obeležene rednim brojevima, na unutrašnjem delu pakovanja, sa obe strane, i to od 1. do 7. u levom vertikalnom redu, i od 8. do 14. u desnom vertikalnom redu. Doze aktivne supstance rastu sa rastom rednog broja ampule u vertikalnom redu, i to tako što u prve dve ampule ima 0,01 mg aktivne supstance (viskum album), u naredne dve ampule ima 0,1 mg aktivne supstance, a u poslednje tri ampule ima 1mg aktivne sustance u 1 ml rastvora. Na ampulama se ovo nalazi obeleženo, kao i rok važnosti. Ampule se otvaraju blagim lomljenjem užeg dela ampule, testarica nije potrebna. Efekat dejstva aktivne supstance je imunostimulativni i citostatički. Važno je, prilikom korišćenja ove terapije, držati se sledećih pravila, i poznavati sledeće činjenice :

1. **SADRŽAJ AMPULE SE NE MEŠA NI SA KAKVIM RASTVOROM, DAJE SE TAKAV KAKAV JESTE UNUTAR AMPULE, ISKLJUČIVO POTKOŽNO, U BLIZINI MESTA ZAHVAĆENOG OBOLJENJEM.**
2. **AMPULE SE DAJU ONIM REDOSLEDOM KOJIM SU I OBELEŽENE REDNIM BROJEVIMA, ODNOSNO OD PRVE DO SEDME, I TO PO JEDNA AMPULA SVAKI DRUGI DAN. NAKON SEDME AMPULE PRAVI SE PAUZA U TRAJANJU OD SEDAM DANA, PASE POTOM DAJU AMPULE OD OSME DO ČETRNAESTE, TAKOĐE JEDNA AMPULA SVAKI DRUGI DAN. NAKON CELE SERIJE OD 14 AMPULA, PRAVI SE PAUZA OD TRI DO ČETIRI DANA DO POČETKA DAVANJA NOVE SERIJE OD 14 AMPULA (drugim rečima prvo se daje levi vertikalni red, po jedna ampula svaki drugi dan - ovo traje 14 dana, pa se napravi pauza sedam dana, i potom se daje desni vertikalni red, isto po jedna ampula svaki drugi dan - dakle, narednih 14 dana ukupno). OVIM**

PROTOKOLOM DAVANJA, KOGA NE TREBA MENJATI AKO LEKAR NE ODREDI DRUGAČIJE, JEDNA SERIJA INJEKCIJA TRAJE OKO 1,5 MESEC.

3. ŠTETNI EFEKTI OVE TERAPIJE, AKO SE DAJE KAKO JE PROPISANO NISU POZNATI.
4. PROPRATNI EFEKAT OVE TERAPIJE MOŽE BITI SKOK TELESNE TEMPERATURE, ŠTO SE SMATRA POŽELJNOM REAKCIJOM, UKOLIKO TEMPERATURA NE PRELAZI 38 STEPENI CELZIJUSOVE SKALE. AKO JE SKOK VEĆI OD 38 STEPENI, POTREBNO JE PREPOLOVITI DOZU, ODNOSNO SADRŽAJ SLEDEĆE AMPULE, DAKLE DATI SAMO POLA SLEDEĆE AMPULE, ILI ODLOŽITI DAVANJE DO KONSULTACIJE SA LEKAROM. TEMPERATURU SPUŠTATI UOBIČAJENIM SREDSTVIMA.
5. MOŽE SE JAVITI CRVENILO NA MESTU DAVANJA. KORISTITI HLADNE OBLOGE KRAĆE VREME (15 MIN).
6. OVA TERAPIJA NE OMETA, NITI JE U KOLIZIJI SA BILO KOJOM DRUGOM TERAPIJOM ILI MEDICINSKOM PROCEDUROM.
7. TOKOM ORDINIRANJA OVE TERAPIJE POTREBNO JE IZBEGAVATI PARADAJZ, A POŽELJNO JE DA SE, U DOGOVOROM SA TERAPEUTOM, PRILAGODI CELOKUPNA ISHRANA PACIJENTA. ALKOHOL I DUVAN SU ZABRANJENI, JER BITNO UMANJUJU DELOTVORNOST TERAPIJE.
8. TERAPIJA ISKADOR-om SE ZASNIVA NA ČISTO BILJNOJ OSNOVI. OSNOVNI SASTOJAK SADRŽAJA AMPULA JE EKSTRAKT IMELE, ČIJE JE LATINSKO IME VISKUM ALBUM, BILJKE KOJA RASTE KAO PARAZIT NA RAZNORODNIM VRSTAMA DRVEĆA, I ČIJA SVOJSTVA UKAZUJU NA MOGUĆNOST USPEŠNOG DELOVANJA NA NOVOSTVORENA, BUJUĆA TKIVA.